La contraception après une anesthésie

INFORMATION POUR NOS PATIENTES





Centre Hospitalier du Valais Romand Service d'anesthésiologie et de réanimation

Vous avez reçu un médicament qui peut affecter la contraception. Veuillez lire attentivement le texte au verso.

Hôpital du Valais Spital Wallis L'efficacité d'une contraception hormonale est limitée par le sugammadex (Bridion®). Le risque de grossesse s'en trouve accru. Les points suivants doivent être observés selon le type de contraception hormonale:

SI VOUS PRENEZ UNE CONTRACEPTION ORALE («LA PILULE»)

- Progestatifs seuls en mono-préparation («mini-pilule»)
- Contraceptifs combinés progestatif/oestrogène («pilule»)

Même si vous avez pris votre pilule ce matin, son efficacité est rendue incertaine par l'administration de sugammadex. Cela correspond au risque d'une «pilule oubliée».

Veuillez lire la remarque concernant l'oubli de prise d'une pilule sur la notice d'emballage de votre pilule contraceptive.

SI VOUS UTILISEZ UNE AUTRE CONTRACEPTION HORMONALE

- Injection hormonale pour trois mois
- Patch contraceptif
- Implant hormonal
- Anneau vaginal
- Stérilet hormonal

Vous devez utiliser une méthode contraceptive à effet barrière, p. ex. des préservatifs, durant les 7 jours suivant l'injection de sugammadex. L'équipe médicale en charge de votre traitement se tient à votre disposition si vous avez des questions.

RÉSUMÉ

- Vous avez reçu du sugammadex aujourd'hui
- Le sugammadex peut affecter la contraception
- Si vous prenez la «pilule» (contraceptif combiné ou «mini-pilule»), vous devez suivre la recommandation en cas d'«oubli de prise» figurant sur la notice d'emballage (même si vous avez pris la pilule aujourd'hui).
- Si vous utilisez un patch contraceptif, un implant hormonal, l'injection hormonale pour trois mois, un anneau vaginal ou un stérilet hormonal, vous devez utiliser une méthode contraceptive à effet barrière (préservatifs) durant les 7 prochains jours.

Patiente:	
Date:	
Médecin:	

Centre Hospitalier du Valais Romand Service d'anesthésiologie et de réanimation

Contact: +41 (0) 603 42 37

Réf. 679 420 – 02/2023 Texte Universitätsspital Basel